

醫心方卷第十

從五位下行鍼博士魚丹波介丹波宿祢康賴撰

治積聚^{しやろいし}方第一

治諸^{イタハラ}疝方第二

治七^{イタハラ}疝方第三

治寒疝方第四

治八^{イタハラ}疝方第五

治癰^{イタハラ}瘰方第六

治果癰方第七

治蛇瘰方第八

治癰^{イタハラ}瘰方第九

治臭癰方第十

治宗癰方第十一

治駁癰方第十二

治米癰^{イタハラ}方第十三

治水癰方第十四

治食癰^{イタハラ}方第十五

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治積聚方第一

治諸疝方第二

治七疝方第三

治寒疝方第四

治八疝方第五

治癰疽方第六

治果癰方第七

治蛇癰方第八

治蠃癰方第九

治臁癰方第十

治宗癰方第十一

治敗癰方第十二

治米癰方第十三

治水癰方第十四

治食癰方第十五

治酒癰方第十六

水病證候第十七

治大腹水腫方第十八

治通身水腫方第十九

治十水腫方第二十

治風水腫方第二十一

治水癰方第二十二

治身面癰方第二十三

治疔腫方第二十四

治黃疸方第二十五

治黃疸方第二十六

治穀疸方第二十七

治酒疸方第二十八

治女勞疸方第二十九

治黑疸方第三十

治積聚方第一

病源論云積聚者由陰陽不和府藏虛弱受於風

邪搏於府藏之氣所為也府者陽也藏者陰也陽

浮而動陰沉而伏積者陰氣五藏所生始發不離

其部故上下有窮也聚者陽氣六府所成故無

根本上下無所留心其痛無有常處肝之積名曰肥

氣在左脇下如覆杯有頭足令人發瘕瘕心之積名曰伏

梁起脊上如臂上至心下脾之積名曰痞氣在胃管覆

大如盤令人四肢不收黃疸飲食不為肌膚肺之

積名曰息責在右脇下覆大如杯令人洒淅寒熱腎

之積名曰贲然發於少腹上至心下若死責之狀上下無

時令人喘逆骨萎少氣繫門方云辨曰肥氣者肥盛

也言肥氣如覆杯突出如肥盛之狀伏梁者言其大如臂

狀似屋舍梁棟也故名伏梁瘕者滿也言其氣滿瘕結

成積也息者長也奔者羣也言其氣漸長而迫於

積名曰息。真在右脇下覆。大如坏。令人洒淅寒熱。腎

之積名曰貫。此發於少腹上至心下。若此真之狀。上下無

時。今人喘逆。骨萎。少氣。繫門。方云。辨曰。肥氣者。肥盛

也。言肥氣如覆。坏突出如肥盛之狀。伏梁者。言其大如臂

狀。似屋舍梁棟也。故名伏梁。痞者。滿也。言其氣滿痞結

成積也。息者。長也。奔者。羣也。言其氣漸長而通於

羣。故曰息。奔病似伏豚而上衝心者也。又有奔豚之氣。非

積病也。名同而病異焉。華他方云。貳車丸。常在尊者

後。軍故名二車丸。主心腹衆病。羣上積聚。寒熱。食飲

不消。或之。憂悲喜怒。或之。勞倦。氣結。或有故疾。氣

浮。有上飲食。衰少。不生肌。害若辟。在脇。吞一丸。

常消。若驚恐不安。吞一丸。日三。獨卧。不恐。病劇。晝

日六七夜三吞。微者。晝日四五夜每吞。寒痺。隨利

去。令人善。米氣。又治女子絕產。少腹苦痛。得陽

氣。痛。引胸中。積寒所致。風入子道。或月經未

絕。而合陰陽。或急欲溺。而合陰陽。或衣未捺

而合陰陽。或急便著之。濕從下上。久作長病。

吞藥。如。上。百。日。有。子。貳。車。丸。方。

蜀椒スベキカニ成セ擇ハク一斤一カ 乾薑セウハカア大小相稱セウハカア廿枚二十枚 粳米ニホ一升

朗陵烏頭カサリ大小相稱セウハカア廿枚二十枚 鉞カサリ中灰中一升

凡五物以水一斗半漬。灰練囊中盛。半絞結。

內灰中一宿。暴乾之。皆未諸藥下篩。和以蜜。噉

吞如梧子丸ハカリ。勿用漿水也。身中當痺藥ヒルキ

力盡乃食。老小裁之。

范汪方五通丸。主積聚。留飲。宿食。寒熱。煩結。長肥

膚。補不足方。

附目一兩。汗。附子一兩。厚朴一兩。杏仁三兩。煮。

凡五物以水一斗半漬灰練囊中盛半紋結
內灰中一宿暴乾之皆未諸藥下篩和以蜜唾
吞如梧子丸勿用漿水也身中當痺藥
力盡乃食老小裁之

范汪方五通丸主積聚留飲宿食寒熱煩結長肥
膚補不足方

枳實一兩行 附子一兩炮 厚朴一兩一名消石 杏人子三兩整
半夏一兩洗 亭歷三兩一名消石 芒消五兩整 次黃九兩整
凡八物別搗亭歷杏人使就合和諸藥末
使調和以蜜搗五千杵吞必梧子二丸

又玄三台丸主五藏寒熱積聚臃脹腹大空鳴而意食不
生肌膚利者欬逆若傷寒病已愈新食不殺飯已吞
五丸飲多吞十九取大便秘利長客發氣補不足可常

心腹方

大黃十二兩一方二兩推碎 亭歷一升整令變色 附子一兩炮
杏人一升整令變色 消石一升整令變色 胡二兩一方前胡
厚朴一兩整 伏苓半兩整 半夏一兩洗
凡十物皆搗篩以蜜搗三万杵丸如梧子從

五丸起不知稍增取大便秘利為度

天云治久寒積聚方 虎杖根一升許搗之以酒漬日三

飲一升

小品方玄七氣丸治七氣之為病有寒氣怒氣喜氣憂氣
患氣愁氣熱氣此七氣為病皆生積聚堅牢如坏
在腹中心痛煩悶不能食時來發作有時發
痛欲絕也其寒氣則吐逆心下脹滿其熱氣則恍惚悶
亂常如眩暈失精其怒氣則不可當熱病上過心短氣
次色不身息其患氣則責氣心下不得食其患氣

飲一升

小品方云七氣丸治七氣。為病有寒氣、怒氣、喜氣、憂氣、悲氣、愁氣、熱氣。此七氣為病，皆主積聚，堅牢如坏，在腹中心痛煩急，不能食，時來發作，有時發，痛欲絕也。其寒氣則逆心下脹滿，其熱氣則恍惚悶，亂常如眩，目失精，其怒氣則不可當，熱病上過，心短氣欲絕，不得息。其悲氣則積聚心下，不得食飲，其喜氣則不可疾行，久立，其憂氣則不可苦作，卧不安，席其愁氣，怒忌置物四傍，不復憶處。四支千足跗腫，不得舉。治產生早起，中風餘疾也。

大黃十分 人參二分 枳實二分 半夏三分

烏頭五分 桔梗三分 細辛三分 萊菔三分

干薑三分 菖蒲三分 伏苓三分 芍藥三分

紫苑三分 其草三分 石膏三分 蘇胡三分 桃仁三分

凡十七物治合下痢，和以蜜酒服，如梧子三丸，日三，不知稍增，以知至十九丸為度。
今案錄驗方有桂心、元蜀椒、治宿寒積聚，未滿諸毒氣結，逆氣腹中結，如石，令人強健，身壯澤。

千金方七氣湯治憂氣、氣勞、氣寒、氣愁、氣或飲食為氣，高氣或虛勞內傷，五歲不調，陽氣衰，以逆上下方。

甘草兩 枳樓二兩 夕藥二兩 枳三兩 半夏二兩

人參兩 于地黃二兩 萊菔五兩 八味切以水一斗

煮取三升分三服

又云神明度命丸治久病腹內積聚，大小便不通，氣上搶胸腹中脹滿，逆若飲食服之甚良方。大黃一兩

夕藥一兩 二味蜜丸如梧子，服四丸，日二，不知可增至

六七丸，以和為度。又云脇下即氣積聚，往來寒熱，

知濕瘧方 莖鼠壤土製之，令即易

葛代方云：露音凡台大寒，令責取方，與石干薑。

煮取三升分三服

又云神明度命丸治久病腹內積聚大小便不通氣上
搶胸腹中脹滿逆若飲食服之甚良方 大黃一兩

夕藥一兩 二味蜜丸如梧子服四丸日二不知可增至

六七丸以和為度又云脇下即氣積聚往來寒熱

知濕瘧方 葦鼠壤土製之令即易

葛氏方玄露宿丸治大寒冷積聚方 礬石于薑

桂桔梗附子皂莢各三兩

搗篩蜜丸服如梧子十九日三稍增至十五丸

僧深方治心下支滿痛破積聚欬逆不受食寒熱喜噦

方 蜀椒五分 于薑五分 桂心五分 烏頭五分

石心物治合下痞蜜和丸如小豆先鋪食以米汁服

一丸日三夜一不知積增一丸以知為度禁食飲

新錄方治積聚方

素日三

德貞常方積聚方 灸第十三椎節下間相去三寸

又方灸上管穴在鳩尾下二寸又方灸胃管穴在上管下

一寸又方灸水分穴在臍上寸 新羅法師方

續徒子皆上以酒一合和而服之二七粒量久老少

用之崔禹錫食經 取蔓菁子一升搗研以水三升煮取一

升濃服之為藥也止治癥瘕也 治諸病方第二

病源論云陰氣積於內復為寒氣無故故使榮衛不調

血氣虛弱故風冷入其腹內而成病也病者痛也成少腹

痛不得大小便或干之厥冷繞脊痛曰汗出或冷氣逆

上搶心腹冷心痛或裏急而嘔痛此諸候非一故云諸

病也八十一難云五藏謂之病六府謂之病又曰男病謂

之病女病謂之病 葛氏方治卒得諸病少腹及陰中

升濃脹之為藥也。治諸病方第二

病源論云：陰氣積於內，復為寒氣，無故故使榮衛不調。

血氣虛弱，故風冷入其腹內，而成疝也。疝者，痛也。成少腹

痛，不得大小便，或干之厥冷，繞脊痛，曰汗出，或冷氣逆

上，搶心腹，冷心痛，或裏急而嘔痛，此諸候非一故云。諸

疝也。八十一難云：五藏謂之疝，六府謂之瘕。又曰：男病謂

之疝，女病謂之瘕。葛氏方治率得諸病，少腹及陰中

相引痛，如絞，白汗，欲死方。搗沙參下篩，以酒服方

寸匕，立愈。又方：楸二合，干薑四兩，水四煮，取二升，去滓

內，枳一斤，又煎取半升，分再服。又方可服諸利

丸下之作，走馬湯三佳。又方：灸心鳩尾下一寸，名

關及左右各寸，無百壯。

摘要方：療積年腹內宿結，疝令氣及諸瘕。瘕方：香

義爛豕心一升，曝乾，薇煮令唯去石薇煮小芥子一升，令色黃。

石蜜丸，空腹酒服，廿五丸，如至廿五丸，曰二服，初服半劑。

已來腹中覺絞痛，勿恠，此是攻病之候。

新錄方：治諸疝方。桃白皮一升，以水三升，煮取一升，

煩服之。又方：酒服，薤黃二方寸匕，曰二

又方：搗桃人八十枚，去皮研如泥，酒下。又方：搗大蒜

為泥，酒服，如煮二枚，曰三范，注方治心疝，灸法兩足

大指甲，本甲寅之際，甲內各半主，隨年壯。又方

灸足心及足大指甲後橫理節上，及大指歧間白黑肉際

百壯，則心。治七疝方第三

病源論云：七疝者，厥逆心痛，足寒清，飲食吐，不下，名

曰厥疝。腹中氣乍滿，心下盡痛，氣積如臂，名曰瘕。病寒飲，昂脇下腹中盡痛，名曰寒疝。腹中乍滿，乍減

而痛，名曰氣疝。腹中痛在脊旁，名曰癰疝。腹中在脊

大指甲本甲寅之際甲內各半主隨年法 又方

灸足心及足大指甲後橫理節上及大指政同白黑肉際

百壯則心 治七疝方第三

病源論云七疝者厥逆心痛之寒清飲食吐不下名

曰厥疝腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰瘰

疝寒飲昂脇下腹中盡痛名曰寒疝腹中乍滿乍減

而痛名曰氣疝腹中痛在脊旁名曰盤疝腹中在脊

下有積聚名曰肘疝腹與陰相引而痛大行難名狼

疝也皆由血氣虛弱飲食寒溫不調之所生也

錄驗方七疝治人腹中有大疾厥逆心痛之寒食

吐不下名曰厥疝腹中氣滿心下盡痛氣積大如臂

名曰僻疝寒飲食昂脇下腹中盡痛名曰寒疝腹中乍滿乍

減而痛名曰氣疝腹中痛在脊左傍名曰盤疝腹痛脊

右下有積聚名曰附疝腹與陰相引而痛大行難名曰

狼疝治方

人參五分 桔梗五分 黃芩五分 細辛五分 干薑五分

蜀椒五分 當歸五分 芍藥五分 厚朴五分 烏頭分

凡十物治下篩和以白蜜丸如梧子大食服四丸日三

不知稍增禁生臭猪宗 今案僧深方有八物桔梗細辛桂心芍

藥厚朴黃芩各一兩半蜀椒二兩半烏

喙二分合服三九日三范汪任方有十二物蜀椒五分干薑四分厚朴四分桔

梗二分烏喙一分黃芩四分細辛四分芍藥四分乾胡一分伏苓一分枳

治寒疝方第四

病源論云陰氣積於內則衛氣不行衛氣不行則

寒盛故令惡寒不飲食手足厥冷繞脊痛白汗出遇

寒即發故云寒疝

葛氏方治寒疝去來每發絞痛方

吳茱萸三兩 生薑四兩 乾二合 芎藭四升

一分先補食以
消脹七九日三

治寒病方第四

病源論云陰氣積於內則衛氣不行衛氣不行則
寒盛故令惡寒不飲食手足厥冷繞脊痛白汗出遇
寒即發故云寒病

葛氏方治寒病去來每發絞痛方

吳茱萸^{カスハカア}三兩 生薑^{シラハヤア}四兩 豉^{クシ}二合 擘^{ハキ}四升

煮取二升二服

小品方云解急蜀椒湯主寒病心痛如刺繞脊絞痛

腹中盡痛白汗自出欲絕方 蜀椒^{フセウカア}三百枚 一方二百枚

附子一枚 剉^{カキ}末^{マタ}半升 干薑^{カンシヤウ}半兩 大棗^{オホナツ}廿枚 半復^{ホシクア}十二枚

甘草^{カンサウ}一兩 凡七物以水七升煮取三升熱服一升不更服服一升

一升注心方蜀椒湯治寒病腹痛奔豚方

吳茱萸^{カスハカア}升^{ヤサシ}當歸^{トウキ}一兩 芍藥^{セキヤク}一兩 黃芩^{ワウキン}一兩

蜀椒^{フセウカア}二合 五味以水八升煮取二升半分三服

范汪方治寒病腹中痛小建胡湯方 苳胡^{ソセウ}半升

半夏^{ホソクミ}半升^洗 黃芩^{ワウキン}三兩 甘草^{カンサウ}三兩 人參^{オウゴン}三兩

生薑^{シラハヤ}三兩 大棗^{オホナツ}十二枚 凡七物以水一斗升煮得

六升去滓服一升日三

耆婆方治寒病積聚用力不節脈絕傷羸瘦不能

食飲此藥令人強健除冷氣痞丸方

烏頭^{ウヅ}廿分^炮 甘草^{カンサウ}八分 炙^炙 真^真芍藥^{オウゴン}八分 厚^厚 歷^歴 八分^熬

芍藥^{セキヤク}八分 大黃^{オウゴン}八分 右七味搗篩以蜜和為丸如

梧子^コ服五丸日二忌猪臭五辛生冷酢滑

新錄方治寒病及衝心痛方 塩五合 竜安墨三合

以水一大升煮取一升半頓服之吐老

食飲此藥令人強健除冷氣痞九方

烏頭廿分炮

甘草八分炙

真オウゴン芍藥オウゴン分

亭歷ハセリ八分煎

芍藥八分吾丸ハ

大黃八分オウゴン

右七味搗篩以蜜和為丸ハセリ如ハセリ

梧子脹五九日二忌猪臭五辛生冷酢滑ナメノヒヤカニ

新錄方治寒疝及衝心痛方

鹽五合

竈突墨三合カマクラトウ

以水一大升煮取一小升頓服之ハセリ吐ハセリ

又方水一升ハセリ合ハセリ漬頭一升五合絞取汁服之方桃人

八十枚去皮研如泥酒下之又方桃白皮一升以水三升

煮取一升頓服之又方以水若酒服ハセリ亂ハセリ絞ハセリ灰方寸匕

又方水清服伏龍肝方寸匕ハセリ又方水服ハセリ亂ハセリ絞ハセリ灰方寸匕

葛灰方寸匕ハセリ又方酒五升燒廬角一枚投酒

中分二三服之又方灸乳下一寸是大指蒸毛

又方灸上三寸名大倉吞下三寸名丹田ハセリ各五七至並

要穴又方灸上管七壯又方灸窮脊上寸百壯

又方灸脊中百壯治八痞方第五ハセリ

病源論云榮衛不和陰陽障絕而風邪外入ハセリ與衛氣

相搏ハセリ血氣擁塞不通而否也否者塞也言府藏塞不

宣通也由憂恚氣積或墮墜內損所致其病腹內氣

結腹時ハセリ吐熱是也其名有八故云八痞而方家不謂其

證狀

八十一難云脾之積名曰痞氣在胃管覆ハセリ大如盤令

人四支不收ハセリ莖黃疸飲食不為肌膚ハセリ今案楊氏注云痞否也言

滿也言其氣滿ハセリ錄驗方治八痞ハセリ麝香丸方

光明沙 麝香 丁香 曾青一名青 大黃オウゴン七合

黃芩三分 朴消兩 亭歷ハセリ子ハセリ六分 甘草一兩

巴豆六分 凡十物搗篩蜜丸如小豆一丸平旦空

腹脹若老人壯者同患之人脹如梧子一丸

八十一難云脾之積名曰痞氣在胃管覆之大如盤令

人四支不收莖葉疸飲食不為肌膚今案楊氏注云痞不也言否結成積也醫門方云痞者

滿也言其氣滿錄驗方治八痞廢香丸方

光明沙 麝香 丁香 曾青各兩一名曾青 大黃七合

黃芩三分 朴消兩 亭歷子六分 甘草一兩

巴豆六分 凡十物搗篩蜜丸如小豆一丸平旦空

腹脹若老人壯者同患之人脹如梧子一丸

傳信方云療秋夏之交露坐夜久腹內如羣石在腹

中痛者方 大豆半升 生薑八分 右以水二升煎取

一升已下頓服其堅痞立散 治癥瘕方第六

病源論云癥瘕者皆由寒溫不調飲食不化與藏氣

相搏結所生也其不動移者直名為癥若病雖有結

聚而可推移者名為瘕也昌氏方云癥瘕病衝心不

移動飲食痛者死 新錄方云治一切癰溫白丸方南

州刺史臣陰鏐言臣家慈澤視事三年自到任官

以來臣妻不使水土有地下濕遂得腹脹病頃年已

來恒遣醫師療治於今不瘳有一蒼吳道士名杜勝

到臣州堺採藥臣遂呼道士至舍說臣專妻病狀于

時道士昂與臣藥方用治乃病無不得瘳

紫莞二分 吳茱萸二分 石菖蒲二分 厚朴二分

桔梗二分 皂莢二分 烏頭十分 伏苓二分

桂心二分 干薑二分 黃連二分 蜀椒二分

巴豆二分 人參二分 此胡二分

右十五味搗下篩為散用好蜜和更搗三千杵丸

知梧子大脹二丸不知稍增可至五丸以為度當下心

腹積聚久癥瘕塊大女如桃黃疸宿食朝起臨吐

四支痛上氣持之腹脹心堅結衝心傷攻兩脇徹背連

桔梗二分

皂莢二分

馬頭十分

伏苓二分

桂心二分

干薑二分

黃連二分

蜀椒二分

巴豆二分

人參二分

此胡二分

右十五味搗下篩為散用好蜜和更搗三千杵丸

知梧子大脹二九不知稍增可至五九以為度當下心

腹積聚久癥瘕塊大女如乳黃疸宿食朝起臨吐

四支痛上氣時腹脹心堅結衝心傷攻兩脇徹背連

胸痛無常發繞吞痛狀如虫鑽又治十種水病八種

及胃吐逆飲食噎塞或五林之病或九種心痛亦治積

年飲食不消化或治婦人不產及新緒多年天治世

種乍寒乍熱治一切諸風體如頑癩不知痛處半為

疼痛或眼中生淚或如錐刀所刺鬚髮墮落或面上

瘡如虫行莫不見或手足煩熱或夜卧不安治

七十種風又治世種瘡或大人顛小兒廿五種驚癇

又治五邪夢鬼相通或四支沉重不能飲食昏黑

口欲取死或老或弱似真鬼還終日憂愁

情中不樂或恐或懼悲啼飲食無味婦人月水不調

或多或少負似懷妊如子或連年累月羸瘦困

弊遂致於死或笑或歌為鬼所竊但能服此藥莫不

除愈巨知驗合藥與婦人服之十日下出癥瘕出長尺尋

一枚下膿三升其病即愈巨見被墮傷臨死有積血

天陰即發羸瘦者床不能食飲命在旦夕服此藥

日五九至十五日當下雞肝黑血如手指者二百片白膿二

升赤黃水升病即愈平安狀如常主薄陳勝累有

心腹脹滿經十四年瘦疲氣同飲食不下巨與此藥

服十日下青虫六十枚大小如樹葉頭赤虫身黑下膿

一枚下膿三升其病即愈臣見被墮傷臨死有積血

天陰即發羸瘦者床不能食飲命在旦夕服此藥

日五丸至十五日當下雞肝黑血如手指者二百片白膿二

升赤黃水升病即愈平安狀如常主薄陳勝累有

心腹脹滿經十四年瘦疲氣同飲食不下臣以此藥

服十日下青虫六十枚大小如樹葉頭赤虫身黑下膿

三升許病即愈臣公曹當患著床以經數年服此

藥世曰下完蟻蜋百枚有出青黃水一斗病即愈

臣門師姪長安羸瘦者床食便吐出命在朝夕

從臣求藥服五丸至十五日下出完蟻蜋十枚青水

一斗其病即愈臣家內有人當患心痛發無時節

發即欲死服此藥五六日下完蛇二枚各長尺五寸有頭

眼未有童子班有文其病即愈臣治尼專得大風肩

墮落已經二年遍身出瘡狀如錐刀所刺与藥服九丸至

一月日出瘡虫五色凡三升許其病即愈

知故臣知方大驗死罪謫上也服中禁忌冷水生菜生菓

猪完滑陳曼物五辛 僧深方云消石大丸治

十二瘕及婦人帶下絕產無子及欲服寒食藥而腹中有

瘕瘕僻實者當先服消石大丸下之此丸不下水穀俱下

病耳不令人極也 河西大黃八兩 朴消六兩

上黨人參二兩 甘草三兩 凡四物皆各異搗下篩

以三歲好苦酒量銅器中以竹箸拄銅器中一升作一列

凡三列以量太光內大黃使微沸盡一列乃內餘藥復盡

一列餘有一列極微火便可丸乃令如鴨子中黃

欲合藥當先吞或一宿勿令小兒婦女奴婢見也

欲服者二丸若不能服大丸可分作四丸不過四丸藥

丸欲大欲細能不分文善若人羸者可小食強者不須

上黨人參二兩 甘草三兩 凡四物皆各異搗下篩

以三歲好苦酒量銅器中以竹箸拄銅器中一升作一列

凡三刻以量太光內大黃使微沸盡一列乃內餘藥復盡

一列餘有一列極微火便可丸乃令如鴨子中黃

欲合藥當先吞或一宿勿令小兒婦女奴婢見也

欲服者二丸若不能服大丸可分作四丸不過四丸藥

丸欲大欲令細能不分又善若人羸者可小食強者不須

也若婦人服下者如鷄肝如米汁心黑或半升或三

升下後慎風寒作一坏酒粥食之然後作羹臠自養

如產婦法六月則有子禁生菓脂菜辛菜若服

寒食藥者如法不與餘同也

千金方治癰癥方 灸內踝後宛中隨年壯

又方灸氣海穴百壯在脊下寸半 又方櫛白皮煎

合可丸服之取知病動若下減之 又云治癰癥心

下如坏食則腹滿心絞腹痛方 亭歷子二兩

大黃二兩 澤漆四兩 三味各異搗五百杵下篩

治亭歷令膏下二物散搗五百杵和以蜜服如梧子元

不知稍增以知為度 醫門方療癰癥

腹內脇下小腹脹滿痛冷即發其氣上衝心

不能飲食或欬逆氣急煩滿方 半夏十分 生薑十分

大黃十二分 檳榔人十分 人參八分 吳茱萸六分

厚朴二分 桔梗八分 伏苓六分

枳殼六分 木棗十二枚 水九升煮取

三升下大黃更煮三沸分溫三服相去

八九里當利三二行

廣利方理癰癥腹脹滿堅硬如石臍皮上青脉浮

大黃十二分 檳榔人十分 人參八分 吳茱萸六分

厚朴二分 桔梗八分 伏苓六分

枳殼六分 木來十二枚 水九升 煮取

三升 下大黃更煮三沸 分溫三服 相去

八九里 當利三二行

廣利方 理癥瘕 腹脹滿 堅硬如石 臍皮上青 脈浮

越方 紫葛八分 赤芍藥六分 桔梗六分 紫

頭廿五枚 青木香六分 水路呵梨勒皮

六分 楠李人十分 蜀大黃土枚 牽牛子四分

搏篩蜜丸 如梧子 空腹服十五丸 忌陳臭黏

賦猪宗

葛氏方 治心下有物 大如杯 不得食者 方亭歷二兩

大黃二兩 澤漆四兩 搗篩蜜丸 梧十杆 服如梧子 二日三

治暴癥方第七 病源論云 暴癥者 由藏氣虛弱 食

生冷之物 藏既本弱 不能消之 結聚成塊 卒然而起

其生無漸 名之暴癥也 桂要方 療卒暴癥 腹中

有物 堅如石 痛如刺 晝夜啼呼 不療 百日內皆死 方

大黃半斤 朴消半斤 右先搗大黃為散 然

後和 朴消以蜜合 令相得 於銅器中 置湯上

煎 令可丸 之如梧子 大酒飲 任性服 廿九日 二不知

加之 以知為度 今安葛氏方 朴消三兩 范汪方 有白蜜一斤半 葛氏方 治卒

暴癥 腹中有物 堅如石 痛如刺 晝夜啼呼 不治之

百日死方 取牛膝根二斤 曝合小 于以酒一斗 漬之

蜜塞器 口舉著 契灰中 溫之 令味出 先食 服五方

合至一升 以意量 多少 又方 用蒺藜根 如此 尤良

又方 取常陸根 搗莖 之以新布 藉腹上 以藥枝

加之ヘラ以知イモ為度今女葛氏方朴浦三兩 葛氏方治卒

暴厥腹中有物カクヤ堅如痛如刺セリ晝夜啼呼不治之

百日死方 取牛膝根二斤 曝合カクヤ小子以酒一斗漬之

蜜塞器ミツカニ以舉オホ暑契アハヒ灰中温之令味出先食服五云

合至一升以意量多少 又方用茺藿根フクトク如此尤良

又方多取常陸根ナギ搗カキ莖之以新布藉腹上以藥枝

著布上以衣覆上ヒ冷復易之カキ晝夜勿息ヒ千金集

驗方同之又方取席杖根一升于搗酒漬飲之從少

起曰三佳此酒治カクヤ癰力勝諸大藥

新録方治暴厥カクヤ堅在心脇下欬逆不下食或下不斷

方 吳茱萸三升カクヤ碎之以酒和者令熱布鼠狗裏バクチ以慰

癰上カクヤ冷更炒更燔用之カクヤ癰當移走復逐慰

須都消心カクヤ又云暴厥カクヤ堅脹如石痛欲死者方取鼠壤

去黍穰二物カクヤ水分相和並炒逆熨病上取カクヤ又方軍用

暴鼠壤去三好 又方伏龍肝カクヤ如前方 又方

病在上脹諸吐藥去之カクヤ病在下宜利療之

本草晉カクヤ疑云搗莎草カクヤ計及乾未脹之

治蛇瘕方第八

病源論云人有食蛇カクヤ不消因腹内生蛇瘕カクヤ也有蛇之

精液誤入飲食之內カクヤ令病之其狀常苦飢而則不下

唯噎塞食至胸內即吐出其病在腹摸カクヤ拂カクヤ有蛇狀謂

之蛇瘕

新録方治人食蛇不消カクヤ之精液入飲食中令人病之

腹內有蛇狀名之蛇瘕方 濃作蒜カクヤ鹽カクヤ吸一升以上陶

玄カクヤ餅カクヤ蒜カクヤ鹽カクヤ下蛇之藥カクヤ非虛望之 又方鳩カクヤ酸草

鵝取汁カクヤ脹八合 又方大豆紫カクヤ鵝取汁カクヤ脹一升

揣物季
度高白
楊之試

喉壅塞食至胸內即吐出其病在腹摸揣之有蛇狀謂

之地瘕

新錄方治人食蛇不消之蛇之精液入飲食中令人病之

腹內有蛇狀名之蛇瘕方 濃作蒜齏吸一升以上陶

玄并居蒜齏下蛇之藥非虛望之 又方鳩酸草

鵝取汁服八合 又方大豆紫鵝取汁服一升

又方常思草鵝服如上並頻之取老千金方治蛇瘕

方白馬毛切長分以酒服方寸匕大者自出更服方

寸匕寸中者三出更服三方寸匕小者復出不可一頓

多服數人 又云治蛇瘕大黃湯方 大黃半兩

烏賊魚骨二枚皂莢六銖芒消如鷄子一升黃芩半

兩甘草大如大指一尺 六味以水六升煮之三沸去

滓內芒消適寒溫盡服之十日復莫莫作如上法欲

服之一宿勿食平旦服當下病也 又云治蛟龍病方

開皇六年有人二月八月食芹得之其病發似顛

面色青黃脹寒食強錫三升曰二吐出龍蛟有兩

頭大驗 廣濟方同之今案病源論云三月月蛟龍子治蛇

瘕方第九 病源論云瘕瘕者謂腹內瘕結如瘕狀是也

有食瘕觸冷不消而生者以有食諸雜物得冷變

化而作者皆由脾胃氣虛弱而遇冷則不能剋消所

致瘕之言假也謂其有形狀而推按者也 廣濟方療

蛇瘕方 白馬尿一升五合溫服之令盡老葛氏方治瘕瘕

伏在心 下午掃見頭足特轉動者 白雌雞一隻絕食一宿

明直膏煎飯飽之取其矢無多少於銅器中燭

口之文可鳥未張方寸匕曰四五頁消盡乃止恒始

致瘕之言假也。謂其有形狀而推按者也。廣香方療

蠃瘕方

白馬尿一升五合溫服之令盡老。葛氏方治蠃瘕

伏在心

下午掃見頭足特轉動者

白雌雞一隻絕食一宿

明旦膏煎飯飴之取其矢無多少於銅器中以滴

和火上熬可搗末服方寸匕日四五須消盡乃止恒飴

雞取矢老畢致雞單食

千金方治蠃瘕

方藍菜一斗搗水三升絞取汁服一升日二又方白馬尿

一斗雞子三枚取白合煮取二合空服腹之廣濟方同之

新錄方治蠃瘕瘕團似蠃有脚能動數衝心痛者

方取蒴藋根白皮搗三升以水五六石攪絞取汁服七

八合出又方搗藍汁服七八合治瘕瘕方第十一

病源論云人有胃氣虛弱者食出瘕因為冷氣所搏

不能消之結成瘕瘕之有形狀如瘕也三有飲陂湖之

水誤有小瘕入腹不羣便即生長必有形如瘕養生方

云瘕赤目作贅食之生瘕也新錄方治人食生瘕不

消又飲湖水誤小瘕入腹不羣生長名之瘕瘕方

炭火燒木炭為灰湯或酒中服方寸匕日二又方

燒瘕鱗為灰湯若水服方寸匕日二又方燒羊

久瘕細為灰末服方寸匕日二又方白馬尿服一升

又方煮橘皮湯服之又方豉汁服橘皮末方

寸匕日三

葛氏方治食瘕膾及生癰任胸中不消成瘕方

朴消如半雞子者一枚大黃一兩凡二物以酒二升

煮取一升半盡服之治肉瘕方第十一

久與細為灰末脹方寸匕日二又方白馬尿脹一升
又方煮橋皮湯脹之 又方豉汁脹橋皮末方

寸匕日三

葛氏方治食臭膈及生癰任胸中不消成癰方

朴消如半鷄子者一枚 大黃一兩 凡二物以酒二升

煮取一升半盡脹之 治肉癰方第十一

病源論云人有病而常思得一食託復思之名為

癰癰千金方治癰癰思癰不已食託復思方 空腹

飲白馬尿三升出之 新錄方治癰癰方 飲脹大

豆黃末一匕日二又方濃豉汁脹一升日二又方煮菰菜濃

汁脹之

治癰癰方第十二 病源論云人有因飲食內誤有

頭癰隨而入成癰胸喉間如有虫下上去來者是也

廣潘方 療癰癰喉欲飲油方油一升右香澤煎炙

鉅勞貯安病人頭邊 令口鼻臨油上勿令飲及

傳鼻面並令香氣引吸取飲不得必當疲極眠睡

癰癰當從口出飲油人守視之并投石灰一裹見癰

出以灰拭手投癰抽出須臾油盡即是癰也初從腹出

形如不流水中濃菜隨癰長短生知之

今案千金方云凡癰癰者唯欲飲也 又云療胸喉間覺有癰虫

上下偏聞葱頭食香此是癰虫故也油與葱頭豉湯

術二日不食張口而卧油煎葱豉以鼻口邊虫當漸出

徐引去之無所忌

新錄方治癰癰方滿食竟使吐者是 成煎猪脂亦

消二升煮三沸一服一升日二取吐癰利癰出乃又方飲白馬

尿八合日一老心癰癰令食竟便吐餘癰則不然 已上千金方

上下偏聞カ葱頭食香此是發吐故也油與葱豉豈違

術二日不食張口而卧油煎葱豉以量口邊出當漸出

徐引去之無所忌

新錄方治發瘕方滿食竟使吐者是成煎猪脂亦

消二升煮三沸一服一升日二服吐發利瘕出乃止方飲白馬

尿八合日一老心發瘕令食竟便吐餘瘕則不然已上千金方

治米瘕方第十三病源論云人有好啜米轉久弥嗜啜

之若不得米則胸中清水得米服水便心米不消遂生

瘕結千金方治米瘕恒欲食米方鷄矢一升白米

五合二味合炒令米焦搗末水二升預脹之須臾吐出

病碎米若無米當出淡今案新錄方云水三升和攪預脹之當吐米不盡更脹之大良

治水瘕方第四病源論云水瘕者由絡否滯水氣停聚在於心下

腎經又虛不能宣利洩便致令水氣結聚而成形瘕

在於心腹之間枵按作水聲但欲飲而不用食遍身

虛腫是范汪方治水瘕病心下如數斗油囊裹水

作聲曰飲二三斗不用食但欲飲久病則瘕堅有蝦蟆

蟄治之方草麻就成好者廿枚去皮杯中研合煎

不用搗水解得三合宿不食清旦一頓脹盡日中許當

吐下清黃如茶汁當囊結裏若病不盡却三日更增

脹廿枚草麻如上法若病故復不盡復增十物枵腹如

上法其以盡病為限藥但去病不令人悶乱下病之後填不

可飲當五日斷飲白麋用高方已神良

治食瘕方第十五病源論云有人卒大能食乖其常分因飢作生葱便大

食之仍吐一宗塊繞畔有口其病昂食故為食瘕時由不

韋致此反果成瘕非飲食生令過度之病也

服世枚草麻如上法若病故復不盡復增十物物枚服如上法其以盡病為限藥但去病不令人悶乱下病之後慎不可飲當五日斷飲白麋用高方已神良

治食癥方第十五

病源論云有人年大能食求其常分因飢作生葱便大食之仍吐一宗塊繞畔有口其病昂愈故為食癥時由不韋致此友果成癥非飲食生冷過度之病也

廣洽方療食癥方

有人一食飯七斗并半猪餅

燔並不論因苦飢於葱中過飢急昂食生葱須臾吐

出一宗薄而圍繞畔口無數昂以食授之立消盡飯七

斗乃心吐此物後其人食病便愈此名食癥無所忌治消

癥方第十六

病源論云人有性嗜酒飲酒既多而食穀常少積

久漸瘦其病遂常思酒不得昂吐多睡不復能食

方是胃中有虫使之然名為酒癥

今案諸方無治酒癥之方以此諸癥之方可治之

新錄

方治諸癥方

灸旁光俞三百壯已上

又方酒若飲

服自發灰

又方鵠翅末酒飲

服之曰二

又方亭歷子

三升以酒二升漬

又方鵠翅末酒飲

服之曰二

又方

亭歷子三升

以酒二升漬

又方鵠

三升溫服

蓋曰二水病證候第十七

集驗方云黃帝問

於岐伯曰水与膚脹腸覃石瘕石水何以別之岐

伯曰水之起也自果上微腫如新卧起之狀頭脉動

時欬陰股間寒之胫腹乃大其水已成也以手柔腹隨

平而起如裹水之狀膚脹者寒氣客於皮膚之間欬

然不堅腹大身盡腫皮厚案其腹陷而不起腹色不

變數脹者腹身皆腫大与膚脹水也其色蒼黃腹脉起

腹覃寒氣客於少腹外与膚氣相薄氣不得營因有

於岐伯曰水與膚脹腸覃石瘕石水何以別之岐

伯曰水之起也自果上微腫如新卧起之狀頭脈動

時欬陰股間寒之肝腹乃大其水已成也以手柔腹隨

平而起如裹水之狀膚脹者寒氣客於皮膚之間欬

然不堅腹大身盡腫皮厚案其腹陷而不起腹色不

變數脹者腹身皆腫大之與膚脹水也其色蒼黃腹脈起

腹覃寒氣客於少腹外與衛氣相薄氣不得營因有

所繫瘦而內著惡氣乃起息矣乃生始也大如鷄卵稍

以益大至其成也若懷子之狀久者離歲月案之則難

之則移月事時下石瘕生於胞中寒氣客於子門之

間寒氣不得通惡血當寫不寫血不留心日以益大狀

子如懷月子月事不以時下皆生於此如子導而下

今案石水之證無本方病源論云石水者四肢小腹獨大其

根在膀胱小品方云先從胃腫名曰石水其根在脾

辨曰近驗水病者小便皆澀或黃赤不出溢入經絡致

令腫滿名為水病療法以利小便藥不老則以利大便藥

則愈若目服利藥便利不可心者是死復也又云若諸皮

膚水脹者服諸葢計湯得汗即愈須慎風冷及鹹食

宜食鯉鯉臭苑小豆不利小便物為佳

葛氏方云水病身黑唇安出死水病脈出者死千金方

云水病初起兩目上先腫如老蠶色頰頸脈動腹裏冷

脛中滿按之沒指腹中轉側有聲此其候也又云水病忌

腹上出水者一月死太忌之又云水病忌產乳音

樂房室諠戲一切臭一切寒生冷酢滑蒜粘米豆油臘用力

治大腹水腫方第十八病源論云未疝病皆榮衛否

泄腎脾虛弱所為而大腹水腫者或因大病之後或積

虛勞損或新熱食竟入水自漬及浴冷水氣不散流

溢腹外三焦閉塞小便不通水氣結聚於內乃腹大而

脰中滿枚之沒拍腹中轉側有聲此其候也又云水病忌

腹上出水者一月死太忌之又云水病忌寧孝產乳音

樂房室諠戲一切臭一切寒生冷酢滑蒜粘米豆油臘用力

治大腹水腫方第八病源論云未疔病皆榮衛否

泄腎脾虛弱所為而大腹水腫者或因大病之後或積

虛勞損或新熱食竟入水自漬及浴冷水氣不散流

溢腹外三焦閉塞小便不通水氣結聚於內乃腹大而

腫面文小腹陰下濕手足逆冷腰痛上氣欬喘煩疼故云

大腹水腫千金方治大腹水腫氣息不通命在旦夕

者方牛黃二分昆布一分海藻十分牽牛子八分桂

心八分栲目三兩煮亭歷六兩七味別鴉亭歷煎如

膏合和丸如梧子飲服十九日再稍加小便利為度

醫門方療大腹水腫遍身洪滿小便澀少方海蛤

六合研如麵亭歷子十分煮伏苓六分橋皮四分郁李人四

分棗根白皮五分耳遂二分漢防己六分橋皮四分

搏節為散別搏亭歷子如指內散中蜜丸空腹飲

服七九日一當利一二行如不利加一九以利為度

忌猪宗大醋油臍臍食新錄方治水病腹大

面腫小便澀方亭歷子一升煮紫色芒消三兩吳茱

莫三合鴉為散合三種更鴉加少蜜可丸鴉二千杵

飲服七九日二服以小便利為度忌臍臍老心若熱水

四支煩心胸熱悶者去茱莫効驗方治水大腹亭

歷子散方藍葉三兩大黃一兩半亭歷子二兩煮

凡三物治節先食消脹二方寸匕欲丸服蜜和服如大豆

目廿九小品方治水腫大豆湯方大豆三斗

水五斗煮令熟出豆澄計更內義酒五斗微火煎如飴

服一升漸增之合小下者婆方治人痲病四支脚朕面

水

飲脹七九日二服以小便利為度忌鹹酢老心若熱水

四支煩心胸熱悶者去茱萸効驗方治水大腹亭

歷子散方 藍葉三兩 大黃一兩半 亭歷子二兩

凡三物治節 先食消脹二方寸匕欲丸服蜜和服如大豆

目廿九小品方治水腫大豆湯方 大豆三斗

水五斗煮令熟出豆澄計更內養酒五斗微火煎如飴

脹一升漸增之合小下者婆方治人痲病四支脚肢面

腹俱腫方 香薷一百斤以水煮之令熟去滓更煎令

如飴糖少服之當下水小便數即老

又云治人多水身重口中水出面虛越腫宜寫方

桂心一兩半 大腹櫛榔三七匕搥研 生薑一兩半

三味切以水九升煮取三升分三服

下水即老

葛氏方治大腹水病方

防己甘草 亭歷各二兩 梔子酒和服如梧

子三九日三恒將之取都消乃止 又方白茅根一大把小豆

三升水五升者訖去茅根食豆水隨小便下 又方恒

取小豆飯并汁佳 本草經云獮豸主久水腫不

老垂死者作養食之下水大効 搗要方療大水腫神

方白錫四兩 桂心一兩 桑根六升 甘草一兩 人參一兩

細辛一兩 大棗十四枚 右以水九升煮桑根取三升以煮藥

取一升去滓內錫令洋盡分三服一日一夜小便五六升即老

龍門方療腹滿如石積年不損方 取白楊樹東南

皮去蒼護風細押削五升煮令黃酒五升熱淋訖即以絹

代衣盛滓還內此酒中密封再宿脹 灸水病法小品方云

灸臍俞百壯三報 在第七椎下 灸脾俞百壯 在十一椎下 灸意俞

百壯 在當脊九 治通身水腫方第十九

細辛一兩 大棗十四枚 石水九升者 桑根取三升以煮藥
取一升去滓內錫令洋盡分三服一日一夜小便五六升是

龍門方療腹滿如石積年不損方 取白楊樹東南

皮去蒼護風細押削五升熬令黃酒五升熱淋訖即以絹
代衣盛滓還內此酒中密封再宿服 灸水病法小品方云

灸臍俞百壯三報 在第七椎下 灸脾俞百壯 在十一椎下 灸意俞
百壯 在當脊乳 灸通身水腫方第十九

病源論云水病者由腎脾俱虛故也 腎虛不能宣通水
氣脾虛又不能制水故水氣盈溢添液皮膚流遍四支所

以通身腫也 僧深方治通身水腫大小便不利方 常陸根三升
赤小豆一斗凡二物水一斛煮取一斗稍飲汁食豆以小

便利為度 又云治大水面目身體年足皆腫方 大戟分
耳歷三分 若參一分 葱花一分凡四物治下節以小麥粥服

方寸匕良効 范汪方治身體流腫心下脹滿經氣逆客
飲食方 大豆一斗以水三斗煮之令得一斗七升去滓內斗

好酒合煎之令得一斗七升服一升日三服心方馬肺湯治一身
面目浮腫方 未耳歷彈丸 大棗廿枚 水三升煮棗

取汁一升半去棗內耳歷煮取一升頓服之得至五服若
帶水氣者先服青龍湯一劑乃服之 今案醫門方耳歷子兩

張仲景方青龍湯四治文疼痛面目肘腫方 麻黃半斤
去節細辛二兩 干薑二兩 半夏二兩 凡四物切以水八升

煮得二升服之 又云治脾胃水面目手足之肘腫胃管堅大
滿極氣不能動搖棗根白皮湯方 棗根白皮切二升桂

一尺生薑三顆 人參一兩 凡四物切以水三斗煮取棗根湯
得一斗絞去滓內桂人參生薑黃飴十兩煮之得七升服一

升消息更服 今案本草桂一尺
醫門方療遍身腫脹小便混方

去水... 千薑二兩 半夏二兩 凡四物切以水三斗者取棗根竭

者得二升服之 又云治脾胃水面目手足之腫 胃管堅大

滿極氣不能動搖 棗根白皮湯方 棗根白皮切二升桂

一尺生薑三顆 人參一兩 凡四物切以水三斗者取棗根竭

得一斗絞去滓內桂人參生薑黃芩十兩煮之得七升服一

升消息更服 今案本草桂一尺

醫門方療遍身腫脹小便混方

高麗子二兩 欬擣如泥 大棗廿枚 玄核

水一大斗 煮取一小升 絞去滓內高

麗子於棗中微煎攪勿停手可丸

上丸如梧子空腹頓服令盡當利一二行

凡分二服六次

治十水腫方第廿

病源論云十水者青水赤水黃水白水黑水懸水風

水石水裏水氣水也青水者先從面目腫遍一身其

其在肝赤水者先從心腫其根在心黃水者先從腹腫其

根在脾白水水者先從肺腫其根在肺黑水者先從

足跌腫其根在腎懸水者先從面腫至足其根在臍風

水者先從四支起腹滿大目盡腫其根在胃石水者由支

小腹腫獨大其根在膀胱裏水者先腹滿其根在小腸

氣水者下盛下虛下未下去其根在大腸皆由榮衛否

滯三腫不調府虛弱所生並令身體虛腫喘息上氣小

便黃溢也 今案諸方十水之名各不同 小品方十水丸治水腫方

腫從頭起名為泉其根在肺肺目主之腫從胸起

名為黃水其根在脾甘遂主之腫從面起名為青

水其根在肝大戟主之腫從腹起名為氣水下實下

虛其根在腸芫花主之腫從股起名為黑水其根在

腎玄參主之腫從面起至足名為懸水其根在臍赤

水其根在脾

三腫不調府虛弱所生並令身體虛腫喘息上氣小

便黃今案諸方十水之名各不同主治之藥以異小方十水丸治水腫方

腫從頭起名為泉其根在肺肺目主之腫從胸起

名為黃水其根在脾甘遂主之腫從面起名為青

水其根在肝大戟主之腫從腹起名為氣水下實下

虛其根在腸芫花主之腫從股起名為黑水其根在

腎玄參主之腫從面起至足名為懸水其根在膽赤

小豆主之腫從內起堅塊四支腫名為石水其根在膀

腕素根主之腫從四支起腹腫名為風水其根在胃澤

漆主之腫從腹起名為冷水其根在小腹巴豆主之腫

從胸中起名為赤水其根在心亭歷主之右十種隨其

病始所在增其所主藥一分巴豆四分去心皮治未合下

篩蜜丸腫如梧子三丸得下為度不下日三三可作

散未食脹半錢上大便利明朝復脹如法再服病愈

即禁飲食但得食于冥可文云十水散治水腫方先從

脚腫名曰清水其根在心亭歷主之先從陰腫名曰紫

水其根在腎澤漆已之先從腹名曰冷水其根在大腸蜀

椒主之先從面目腫名曰氣水其根在肺素根主

之先從手足腫名曰心水其根在小腹巴豆主之先從口脣

腫名曰黃水其根在胃大戟主之先從脇腫名曰飲水其

根在肝芫花主之先從腰腫名曰肝水其根在肝甘

遂主之先從胸腫名曰石水其根在脾伏苓主之先從

從背腫名曰鬼水其根在膽雄黃主之右十物分等

以水服方寸匕當下水多者減脹下少者益之范汪方

治十水丸方第一之水從先從面目腫遍一身名曰青

根在肝菟花主之 先後腰腫名曰肝水其根在萆甘

逐主之先從胸腫名曰石水其根在脾伏苓主之先後

從背腫名曰鬼水其根在膽雄黃主之 右十物分等

主十水隨腫所從始案方偏加藥二分合搗下篩空腹

以水服方寸匕當下水多者減服下少者益之 范汪方

治十水丸方 第一之水從先從面目腫遍一身名曰青

水其根在肝大戟主之 第二之水先從心腫名曰

赤水其根在心亭脂子主之 第三之水先從腹腫名曰

黃水其根在脾甘遂主之 第四之水先從腳腫名曰白

水其根在肺葶藶主之 第五之水先從足腫名曰

黑水其根在腎連翹主之 第六之水先從面腫至三眉

玄水其根在膽菟華主之 第七之水先從四支起腫滿

大人身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之第八之水四支其

腹腫獨大名曰石水其根在旁光素根白皮主之

第九之水從腸滿名曰果水其根在小腸巴豆主之

第十之水乍盛乍虛下去名曰氣水其根在大腸赤

小豆主之 凡十病藥皆主之分等所病形同倍之治合白

蜜丸如小豆先食服一九曰三飲下病服三九人弱者以意減

之治宿食流飲寒熱濕病禁辛菜嗜食生食不禁就之

僧深方治身體浮腫十水散方 芫花三分 決明三分

大戟三分 石韋三分 巴豆三分 澤瀉三分 大黃三分

鬼臼三分 甘遂三分 亭脂三分 凡十物治下 葭以大豆

粥清汁服方寸匕日三 治風水腫方第廿一

病源論云脾胃虛不能制於水故水散溢皮膚又

與風濕相搏故云風水也令人身浮腫如累水之狀按

腫上凹而不起骨節疼痛而惡風是也

小品方云先易台重熱及石熱當風客於合關易記

大戟三分 石韋三分 巴豆三分 澤瀉三分 大黃三分

鬼臼三分 甘遂三分 亭歷三分 凡十物治下 葭以大麦

粥清計服方寸匕三 治風水腫方第廿一

病源論云脾胃虛不能制於水故水散溢皮膚又

與風濕相搏故云風水也令人身浮腫如累水之狀按

腫上凹而不起骨節疼痛而惡風是也

小品方葱豆洗湯治虛熱及石熱當風露卧冷濕傷脫

熱蘊在裏變成熱風水病心腹腫滿氣急不得下頭小

便不利六便難回支腫如皮囊盛水晃如老蠶色隱深

腫如斗莖腫生瘡如死鼠此皆虛損腎中有熱強取風冷濕

損脾胃故也內依方服諸利水藥外宜以此湯洗四支竟以

葱損脾胃故也內依方服諸利水藥外宜以此湯洗四支竟

膏傳之別以猪蹄湯洗陰莖創爛處及疔腫也

葱合青白切一升疾梨子一升春碎 赤小豆一升 菰菜

子一升春碎 蒲葦切五升 巴豆一百枚合心皮打碎

右六物以水一石二斗煮取八斗以淋洗身腫處葱豉膏猪

蹄湯方在本方又云亭歷子迴神酒治風水通身洪腫斗

宗如裂者服之小便利自隨消方 春時釀清酒五斗

一方五升亭歷子三升煮酒中漬再宿便服一合以

漸增之病去小便利腫自消滅皮縮也神良有驗若不能

得春酒餘糧好酒亦佳 槎要方治風水毒氣通身

腫方 猪白皮三兩 桑根白皮五兩 橘皮一兩

紫蘘二兩 生薑四兩 大豆三升 右以水九升者取

一大升分四服三劑百日内忌鹹醋 經心方治風水大豆

煎生桑根白皮細切三升入土一尺者大豆一斗二味以水

六斗煮取一斗去滓下生薑汁二升更煎取四升分五合

第一服曰三夜一以知為度又云牽牛丸治腳腫滿步行

得春酒餘糧好酒六佳 槎要方治風水毒氣通身

腫方 猪白皮三兩 桑根白皮五兩 橘皮一兩

紫蘘二兩 生薑四兩 大豆三升 右以水九升者取

一大升分四服三劑百日内忌鹹醋 經心方治風水大豆

煎生桑根白皮細切三升入土一尺者大豆一斗二味以水

六斗煮取一斗去滓下生薑汁二升更煎取四升分五合

第一服日三夜一以知為度 又玄牽牛丸治脚腫滿步行

不能眾惡毒永腫方 大黃二兩 朴消三兩 煮 牽牛子

七兩 煮 桃人二兩 于薑二兩半 人參二兩 橘皮兩半

右七物搗下篩以蜜和春刀杵服如梧子廿丸以微利為

度腫中心不羣盡劑之者百毒万病廿八種風耶志愈

用甚驗禁冷水猪宗卡 僧深方治風水腫癰癰當

陸酒方 常陸根一升 凡一物以淳二斗漬三宿服

一升當下者減從半升起日三不堪酒者以意減之

又玄治通身腫皆是風虛水氣三治暴腫痛蒲黃酒方

蒲黃一升 小豆一升 大豆一升 凡三物清酒一斗煮三升

分三服 耆婆方治人風水氣面俱腫上氣腹脹不能

食羸弱在床 經時不羣者方 小豆三升 大麻子三升

搗碎以水研汁 桑根白皮一斤合煮一豆熟食豆飯汁

即大下水即老 藥敬本草注者點臭食之主水浮

腫又方脹鴨肪食鴨頭主之水腫 又方桑灰汁煮大豆

飲之下水腫 治疥癬方第廿二

病源論云疥癬由飲水漿不消水氣結聚而成癰在肘

脇之側轉動便痛不耐風寒不欲食而短氣是以癰者

者謂癰側在於脇間故受名焉 効驗方云可服諸下

藥寫之 玄感方灸掖脊兩旁各廿壯 又方灸兩乳下

一夫助間二穴 新錄方杏人作煎或作丸酒服如來日三

腫又方脹鴨肪食鴨頭主之水腫 又方桑灰汁煮大豆
飲之下水腫 治疥癬方第廿二

病源論云疥癬由飲水漿不消水氣結聚而成癬在肌肉
腸之側轉動便痛不耐風寒不欲食而短氣是以癬者

者謂癬側在於脇間故受名焉 効驗方云可服諸下

藥寫之 玄感方灸掖脊兩旁各廿壯 又方灸兩乳下

一夫助間二穴 新錄方杏人作煎或作丸酒服如來日三

又方灸桃人准上 又方單熬大麥蘖為散服如土

本草經水研草麻子廿枚服吐惡沫也

治身面卒腫方第廿三 病源論云身面卒洪腫者

三床病之候也脾虛不能制水故水流溢散於皮膚

令身體卒然洪腫 范汪方治卒腫大戟洗湯方

大戟四兩 莽草二兩 茵芋二兩 大黃二兩 黃連二兩

芒消二兩 亭歷二兩 皂莢二兩 凡八物皆咬咀以一斗

五升煮得一斗絞去滓洗腫上日三 又云治諸卒腫

風掣痛方 朱芥子溫湯和塗帛上以括棊復易

不堪其痛契者小塗之已試良 僧深方治暴腫方

破鷄子攪令其黃白塗腫上燂復塗大良

又方大豆牙熱煮飲汁食豆不過三升良 落手方治暴腫方

葛氏方治卒腫身面皆洪大方凡此腫或是虛氣或

是風冷氣或是水飲氣此方皆治之 用大鯉魚一頭以

淳苦酒三升煮之令苦酒盡乃食莫勿食飯及塩豉他

難也不過再作便愈 又方大豆一升熟煮漉飲汁食豆不

過三作必愈小豆三佳 又方大豆一斗以水五斗煮取二斗去豆

內酒八升更煎取九升分三四服腫老後渴煩不可多飲

又方灸足內踝下白肉際三壯 又云治腫入腹苦滿急安飲食方

事歷七兩 枳目三兩 伏苓二兩 吳茱萸二兩 鳩蜜丸 如梧子

是風冷氣或是水飲氣此方皆治之 用大鯉魚一頭以

淳苦酒三升煮之令苦酒盡乃食勿食飯及塩豉他

雜也不過再作便愈 又方大豆一升熟煮漉飲汁食豆不

過三作必愈小豆三佳 又方大豆一斗以水五斗煮取二斗去豆

內酒八升更煎取九升分三四服腫老後渴煩不可多飲

又方灸足內踝下白肉際三壯又云治腫入腹苦滿急安飲食方

事歷七兩 枳目三兩 伏苓二兩 吳茱萸二兩 枳實九如梧子

脹十九日三又方大戟 烏扇木各二兩 枳實九如梧子旦服

二九當下 又方若腫從脚起稍上進者入腹則斂人治之方

生豬肝一具細切頓食勿与塩乃可用苦酒可 又方煮豉汁

飲之以滓薄脚 治犯土腫方第廿四

病源論云犯土之病由居住之處穿鑿地土犯觸土氣而致

病也令人之肌完頭面遍體盡氣急也謂之犯土新錄方

云以水脹伏龍肝方寸匕此主犯土土氣急腫大好本草拾遺云

藥有同類相伏者不伏水也服去以此案之以鼠壤土並熨

腫上可善 治黃疸方第廿五

病源論云黃疸之病此由酒食過度府藏不和水穀相并

積於脾胃傷為風濕所搏痰結不散熱氣鬱滯故食

如飢令身體面目血甲及小便盡黃而欲安卧若渴而疸

者其病難治疸而不渴其病可治茲於陰部其人

必臨茲於陽部其人

郭其人振寒而發熱也 葛氏方云黃病有五種謂

黃汗黃疸穀疸酒疸勞疸也又云治黃疸一身

面目悉黃如橘方 生第根一把細切以猪膏一升合作

養盡食 今案范汪方治年 又方搗生麥苗水和絞取汁服三

升小麥勝大麥 今案范汪 范汪方治黃疸茵陳湯方茵

陳蒿六兩 大黃二兩 艾子十四枚 凡三物水一斗二升先煮

部其人振寒而發熱也 葛氏方云黃病有五種謂

黃汗黃疸穀疸酒疸勞疸也又云治黃疸一身

面目悉黃如橘方 生第根一把細切以猪突一升合作

養盡食 今案范汪方治年六十以上一服愈 又方搗生麥苗水和絞取汁服三

升小麥勝大麥 今案范汪方不和水 范汪方治黃疸茵陳湯方茵

陳蒿六兩 大黃二兩 文子十四枚 凡三物水一斗二升先煮

茵陳蒿減六升去滓內大黃文子者取三升分三服之

小品方治黃疸身目皆黃皮膚翅塵出三物茵陳湯方

茵陳蒿一把 文子十四枚 石膏一斤凡三物以水八升煮

取二升半去滓石膏一斤猛火燒令赤投湯中沸定

清取汁適寒溫服一升汗出乃愈 千金方治黃疸

身體面目皆黃三黃散方 大黃四分 黃連四兩 黃芩四兩三

味末先食服方寸匕三 今案范汪方凡如梧子服十九又本草拾遺云藥有同類伏者身黃服黃物

錄驗方治黃疸大小便不利面赤汗自出此為表虛裏

實大黃湯方 大黃四兩 茵陳四兩 文子十五枚

消石四兩 凡四物切以水一斗煮得二升半去滓內消石復

煎之得二升分再服得快下乃愈 又方蕪菁子五升

末服方寸匕三

醫門方療黃病身體面目悉黃如橘由暴熱外發迫

之熱因流入胃中所致方文子人三兩 栝樓二兩 苦參二兩

龍膽三兩 大黃三兩 構節 蜜丸 飲服廿九日三加至五六十丸

廣濟方療五種黃方 丁香七枚 依蒂七枚 赤小豆七枚

為散取暖水一雞子許和一錢七服之忌諸熱食

經心方治黃疸單方 搗合小麥煮勿令腹破熟而已曰食永

枕中方治人黃病垂死者服鐵漿一升即愈 冬黃疸法

葛氏方灸脾俞百壯 穴在第十一椎下 兩旁一寸半 又方灸手大陽隨年壯 穴在手

之生因流入胃中而致方文子人三未極極二未極二
龍膽三兩 大黃三兩 梔子 蜜丸 飲服廿九日 三加至五六十丸

廣洛方療五種黃方 丁香七枚 依蒂七枚 赤小豆七枚

為散取暖水一鷄子許和一錢七服之忌諸熱食

經心方治黃疸單方 搗把合小麦煮勿令腹破熟而已曰食永

枕中方治人黃病垂死者服鐵漿一升即愈冬黃疸法

葛氏方灸脾俞百壯 灸在第十一椎下 灸方灸手大陰隨年壯 灸在十指端

又方灸錢孔百壯 穴度乳至脊中屈筋頭骨是 又方灸胃管百壯

穴在鵠尾脊中已上 范汪方灸脊上下兩邊各一寸半二百壯

千金方小品方同之 治黃疸六十以上 僧深方灸第七椎上下 主廣汗 又方屈手大指

各節上理各七主 又方灸脊中推七主 經心方灸兩季心

各七壯 僧深方同之 今案可服可梨勒丸紫雪紅雪等

治黃汗方第廿六

病源論云黃汗之病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風

水汗染衣心黃如麋計此由脾胃有熱汗出而入水中若落

水入汗孔得之 醫門方療黃汗之病狀如風水其

脈沉遲皮膚冷手足微厥面目四支皮膚皆腫胸中

滿方夕藥八兩桂心三兩 黃耆五兩 苦酒五合 以水七升

煮取三升飲一升心當煩勿恠至六七日即差 今案葛氏方夕藥

方苦酒二升 治穀疸方第廿七 病源論云穀疸之狀食畢

心動不安而發黃由失飢大食胃氣衝煙所致

眩心佛鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝煙所致

葛氏方治穀疸方茵陳蒿四兩水一斗煮得六升去滓內

大黃二兩文子二七枚煮取二升分三服當去黃汁 僧深方

治穀疸發寒熱不可食即頭眩心中佛胃不安天茵

陳湯方茵陳蒿二兩黃蘗二兩大黃一兩甘草一兩人參一

兩文子十四枚黃連一兩 凡七物切水一斗煮得三升分三服

心動不安而發黃由失飢大食胃氣衝煙所致
眩心拂鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝煙所致

葛氏方治穀疸方茵陳蒿四兩水一斗煮得六升去滓內

大黃二兩炙子二七枚煮取二升分三服當去黃汁僧深方

治穀疸發寒熱不可食即頭眩心中拂胃不安天茵

陳湯方茵陳蒿二兩黃蘗二兩大黃一兩甘草一兩人參

兩炙子十四枚黃連一兩凡七物切水一斗煮得三升分三服

治酒疸方第七八

病源論云夫虛勞人若飲酒多進穀少者則胃內生熱

因大醉當風入水則身自發黃心中懊痛足脛滿小便

黃面發赤斑若下之久變為黑疸面目黑心中如噉

蒜廔狀大便正黑皮膚紅之不仁其脈浮弱故知之酒

疸心中熱欲噎者當吐之即愈其人必小便不利其後

當心中熱足下熱是其候明也

千金方治飲酒食少飲酒澀結發黃疸心中懊懣

而不甚熱或于臨枳實大黃湯下之方枳實九枚

大黃二兩豆豉半升炙子十枚右四味以水六升

煮取二升分三服今案葛氏方大黃一兩枳實五枚炙子七枚發赤

得黃病方

藤生麥以井華水絞取汁煩脹三升先食

曰三有驗

僧深方治酒疸方

生艾葉一杷麻黃二兩大黃六分大豆一杷

凡四物清酒三升煮取二升分三服艾葉無生用

干半杷

治女勞疸方第七九

病源論云女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒少腹滿

僧深方治消疸方

生艾葉一杷

麻黃二兩

大黃六分

大豆一杷

凡四物清消三杷煮二升分三服

艾葉無生用

干半杷

治女勞疸方第廿九

病源論云女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒少腹滿

急小便難由大熱而交接竟入水所致

千金方云黃疸日晡發熱惡寒少腹急體黃顏黑大

便澹黑足心熱此為女勞也腹滿者難治之方消

滑石石膏各二味分等治以大麥粥汁脹方

寸匕白三小便極利

今案葛氏方有消石石品方有右

醫門方療女勞黃穀黃方 苦參四兩

龍膽三兩

艾子五兩 搗篩為散以猪膽汁和如梧子以飲脹丸

凡日三治黑疸方第卅

病源論云黑疸之狀若小腹滿身體盡黃額上黑足

下熱大便黑是也夫黃疸消疸女勞疸久多變為

黑疸

葛氏方治黑疸者多死急治之方

玄休根根紋取汁傾服一升至三時須病當隨小便去不

去更服之

今案范氏方云黑疸甚